

СОГЛАСОВАНО		
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ		
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ		
Приказ Министерства здравоохранения		
Республики Беларусь		
от « <u>21</u> »	<u>09</u>	<u>20<u>14</u> г. № <u>1064</u></u>
КЛС № <u>10</u>	от « <u>06</u> »	<u>09</u> <u>20<u>14</u> г.</u>

Перед употреблением лекарственного средства обязательно прочитайте листок-вкладыш!

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
 (информация для пациента)
АЛТЕЯ КОРНИ
ALTHAEAE RADICES

Регистрационный номер: _____

Форма выпуска

Измельченное сырье.

Общая характеристика

Кусочки корней различной формы, проходящие сквозь сито с номинальным размером отверстия 5600 мкм. Цвет желтовато-белый или серовато-белый. Запах слабый, своеобразный.

Фармакотерапевтическая группа

Отхаркивающие средства.

Фармакологические свойства

Лекарственное средство растительного происхождения. Обладает противовоспалительным и обволакивающим действием. Полисахариды, входящие в состав корня алтея, оказывают обволакивающее действие на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, способствуют уменьшению раздражения слизистой оболочки ротовой полости, глотки и связанного с ним сухого кашля.

Показания к применению

В комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, сопровождающихся кашлем.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к препарату. Детский возраст до 3-х лет.

Способ применения и дозы

Около 6,5 г (2 столовой ложки) корней заливают 200 мл (1 стакан) холодной кипяченой воды и настаивают при комнатной температуре (без нагревания!) в течение 30 мин при частом взбалтывании. Полученное водное извлечение процеживают, не отжимая оставшееся сырье.

Водное извлечение принимают внутрь 3-4 раза в день после еды: дети от 3 до 5 лет – по 1 десертной ложке, дети от 6 до 14 лет – по 1-2 столовые ложки, дети старше 14 лет и взрослые – по 1/2-1/3 стакана.

Перед употреблением водное извлечение рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данном листке-вкладыше, следует прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Меры предосторожности

Перед приемом лекарственного средства необходима консультация врача.

Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой и др.), необходимо прекратить прием лекарственного средства и обратиться к врачу.

Применение при беременности и лактации. В связи с отсутствием данных не рекомендуется применять во время беременности и лактации.

Применение у детей. Лекарственное средство противопоказано детям младше 3 лет. У детей старше 3 лет возможно применение только после консультации с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Исследования не проводились.

Передозировка

Информация о случаях передозировки отсутствует.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Может быть замедлено всасывание других одновременно принимаемых лекарственных средств. По этой причине водное извлечение не рекомендовано принимать от 1/2 до 1 часа до или после приема других лекарственных средств.

В случае одновременного приема других лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом.

Условия и сроки хранения

В защищенном от света и влаги месте при температуре (15-25) °C.

Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленное водное извлечение - не более 2-х суток при температуре (8-15) °C.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта врача.

Упаковка

По 50 г в пакете бумажном в пачке. Листок-вкладыш (информация для пациента) вкладывается в пачку.

Производитель: ООО "Падис'С"

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Некрасова, 35/2, тел/факс (017) 331-99-12, www.padiss.by.